



RINOPLASTIA POSTTRAUMÁTICA EN SEGUNDO TIEMPO QUIRÚRGICO. A PROPÓSITO DE UN CASO

Victoria Núñez Vera, José Francisco Montes Carmona, Ricardo López Martos, Fernando Iglesias Martín, Nabil Fakh Gómez, Eusebio Torres Carranza.

U.G.C. Cirugía Oral y Maxilofacial.
Virgen del Rocío. Sevilla



INTRODUCCIÓN: Las deformaciones observadas después de una fractura panfacial y su repercusión en la estética facial dependen de varios factores. Incluyendo desde una técnica quirúrgica defectuosa hasta cicatrización desfavorable por parte del paciente. Tanto las repercusiones funcionales como estéticas pueden ser debidas al proceso traumático del esqueleto nasal. Si las estructuras nasales de soporte se ven alteradas y no son reconstruidas, las fuerzas de la contracción de los tejidos perinasales deformarán aun mas las citadas estructuras.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS: Se presenta un caso de paciente politraumatizado por accidente de tráfico con fractura Lefort III bilateral, al cual se realiza en segundo tiempo quirúrgico una rinoplastia con injerto cubital para paliar el déficit de dorso nasal.



OBTENCIÓN DE INJERTO DE HUESO CUBITAL Y REMODELACIÓN



REMODELACIÓN QUIRÚRGICA DE TABIQUE Y PUNTA NASAL

DISCUSIÓN: En este paciente fue elegida la opción del injerto cubital como alternativa a calota craneana, consiguiendo un mejor moldeamiento del hueso, a la vez que se produce acceso de la zona donante y un mejor sangrado perioperatorio

CONCLUSIONES: El injerto cubital puede ser una alternativa válida para reconstrucción del dorso nasal óseo. Puede combinarse con técnicas más usuales como el aporte de cartílago auricular consiguiendo resultados satisfactorios.



FOTOS PRE Y POSTQUIRÚRGICAS. RESULTADO ESTÉTICO POSTQUIRÚRGICO